



Information vedrørende drænanlæggelse på børn

Der kan være forskellige grunde til, at lægge dræn i trommehinderne. Den hyppigste årsag er væske i mellemørerne, der som regel opstår som følge af dårlig funktion af det eustachiske rør. Andre årsager til drænanlæggelse kan være hyppige mellemørebetændelser.

I har fået en tid til operation, og dette tidspunkt er mødetidspunktet. Som regel vil i blive kaldt ned på operationsstuen umiddelbart efter ankomsten.

Jeres barn skal være fastende for mad og mælkeprodukter 6 timer forud for operationstidspunktet. For helt små børn (under 1 år), der har svært ved at faste så længe, er det dog tilladt, at indtage et mindre måltid mælk 4 timer før operationen. Større børn må få tynde væsker (saftevand, juice, sukkervand mv.) indtil 4 timer før drænanlæggelsen.

På operationsstuen vil jeres barn blive bedøvet ved hjælp af en maske, hvor luften indeholder bedøvelsesmiddel. Jeres barn skal ligge ned når det skal bedøves. Dette er dels af hensyn til forurening med bedøvemiddel og dels af sikkerhedsmæssige årsager. I forbindelse med starten på bedøvelsen, kan 2 voksne ledsagere være på operationsstuen.

Når jeres barn sover, under operationen, skal pårørende vente i venteværelset.

Det er vigtigt for jeres barns oplevelse af indgrebet at i har snakket om hvad der skal ské, inden drænanlæggelsen, og at i som forældre viser barnet at det er en naturlig ting der skal foregå.

Mange børn bliver utrygge hvis de oplever at mor eller far viser angst eller manglende accept.

Selve indgrebet består i, at der med en lille kniv laves en ridse i trommehinden, og et lille dræn, der minder om en garntrisse, skubbes ind i slidsen.

Efter indgrebet, vågner barnet op på klinikkens opvågningsstue, hvor i kan være omkring jeres barn. De fleste børn sover 5-15 min. herefter, og mange vågner pludselig op og kan være lidt ulykkelige. Dette skyldes dels narkosemidlerne og dels lidt forvirring over hvad der er sket. I løbet af kort tid herefter, er jeres barn helt friskt, og kan tage med jer hjem.

Normalt er der ikke problemer med flåd eller smerter efter indgrebet, men nogen gange opstår der pusflåd i løbet af et par dage. Fortsætter det udover 3-4 døgn, bør i kontakte klinikken med henblik på behandling med nogle øredråber.

Enkelte børn bløder også fra ørerne umiddelbart efter drænanlæggelsen. Dette skyldes oftest, at der har været lidt infektion i trommehinden.

Er der tegn til betændelse i forbindelse med indgrebet,- vil i få en recept på øredråber med efter operationen. Øret skal dryppes i 5 dage.

2-4 uger efter indgrebet, er der planlagt kontrol, hvor man vil se efter, at drænene er på plads og åbentstående, så de fungerer efter hensigten.

Efterfølgende vil jeres barn blive fulgt i klinikken, hver 3-6. måned, indtil ørerne er fuldstændig normale. Dette er typisk i 3-4 års alderen. Forløbet afsluttes med en høreprøve senest lige før skolestart.

Det er normalt, at der kan opstå kortvarigt flåd i forbindelse med forkølellestilstand, men som regel ophører dette af sig selv. Hvis sekretet fra ørerne bliver ildelugtende eller tykflydende gult, og/eller det flyder mere end 2-3 dage, bør i kontakte klinikken med henblik på behandling med øredråber.



De dræn der normalt bliver isat sidder på plads i 3-12 måneder. I enkelte tilfælde, må man fjerne drænene efter længere tid.

Drænanlæggelse kan medføre ardannelse på trommehinden, og i meget sjældne tilfælde nedsat hørelse, men behandlingen skal ses i relation til de meget betydende skader, som hyppige mellemøreinfektioner eller kronisk væske i ørerne, kan medføre. I enkelte tilfælde lukker hullet i trommehinden sig ikke efter drænet er væk. I så fald vil man med en lille operation i 10-12 års alderen lukke hullet.

Generelle retningslinjer ved operationen

- Er dit barn forkølet, har feber eller hoster op til operationen, bedes i kontakte klinikken.
- I forbindelse med operationen, må 2 voksne personer ledsage barnet.
- Overtøj bedes opbevaret i venteværelset og ikke medtaget på operationsstuen.
- Ledsager må ikke være med under operationen.
- Søskende bedes ikke medbragt på dagen.
- Efter operationen skal barnet være under voksenopsyn resten af dagen. Barnet kan passes i institution dagen efter.

Forholdsregler omkring børn behandlet med dræn

De fleste børn kan udmærket tåle at komme i svømmehal/havvand eller badekar, selv om der er anlagt dræn. Barnet bør dog undgå at springe på hovedet i vandet, hoppe i fra vipper, samt at dykke aktivt. Herudover bør man så vidt muligt undgå specielt opvarmede baby svømmebade, der ofte indeholder større mængder bakterier, og desuden er klorindholdet ofte så højt, at det er lokalt irriterende for slimhinder.

Der er dog enkelte børn, der slet ikke kan tåle at få vand i ørerne. De reagerer efter kort tid med at flyde. Behandlingen er øredråber.

Børn med dræn, der begynder at flyde fra ørerne, har sjældent gavn af penicillin alene, og **man bør altid behandle lokalt med øredråber.**

Der er normalt ikke specielle hensyn at tage til barnet, der har fået anlagt dræn. Barnet kan generelt foretage sig de samme ting som tidligere, og skal ikke være specielt beskyttet på nogen måde. Det vigtigste er, at barnet er optimalt plejet i form af søvn, mad, vitaminer og hensigtsmæssig beklædning.

Greve Privathospital

Hoved-halskirurgisk afsnit

