



Information til patienter der skal have rettet næseskillevæg

Næseskillevæggen kan være blevet skæv af forskellige årsager. Man vil typisk oprette næseskillevæggen, hvis skævheden medfører nedsat luftpassage i næsen.

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Der lægges et lille snit i kanten af næseskillevæggen, i det højre næsebor. Derved løsnes brusken, og overskydende brusk kan fjernes. Der sættes enkelte tråde i åbningen, og den nye stilling af brusken støttes med nogen silikoneplader, der indføres i begge næsebor. Disse silikoneplader er syet fast. Silikonepladerne fjernes ved en kontrolundersøgelse på 7. dagen efter operationen. Som regel lader man trådene i slimhinden blive siddende, da disse opløser sig selv hen ad vejen.

Efter operationen er det tilrådeligt, at foretage saltvandsopsnusninger flere gange dagligt, for at undgå skorpedannelse og fjerne evt. blodrester.

Du har fået en mødetid, og normalt vil du blive kaldt ind til en kort samtale med narkoselægen på dette tidspunkt. Efterfølgende vil du blive bedøvet på operationsstuen. Bedøvelsen foregår via en lille slange der lægges ind i en blodåre. Man mærker intet til selve operationen, og i efterforløbet er der normalt kun moderate smerter.

Det anbefales, at anvende en kombination af Panodil og Diclone som smertebehandling.

Det tilstræbes, at du opholder dig i klinikken så længe som overhovedet muligt. Er operationstidspunktet om aftenen, skal du forvente at overnatte.

Du skal forvente at være sygemeldt 1-2 uger afhængigt af arbejdet.

Generelt

- 1) Da mange smertestillende præparater indeholder stoffer, der nedsætter blodets evne til at størkne, må der ikke indtages smertestillende medicin af denne type 14 dage før operationstidspunktet. Er du i tvivl, om du må indtage et bestemt præparat, bedes du kontakte klinikken.
- 2) Medbring vanlig medicin.
- 3) Lad smykker, pung og lignende blive hjemme. Klinikken påtager sig ikke ansvaret for disse effekter.