



INFORMATION TIL PATIENTER DER SKAL I FULD BEDØVELSE

Operation: dag d. kl.

- 1. Du skal være fastende, før du skal opereres. Dette indebærer, at du indtil 2 timer før operationen (ovenstående klokkeslæt) må indtage tyndt flydende (vand, saftvand, juice og lignende) men IKKE nogen former for mælkeprodukter. Det er hensigtsmæssigt, af hensyn til dit velbefindende efter operationen at du indtager 2-400 ml. sukkerholdigt væske 2 timer før.
Børn der ammes må få bryst/ammemælk 4 timer før operationen.
6 timer før operationen må du indtage et let normalt måltid. Der må ikke indtages alkohol (øl, vin, spiritus) senere end 6 timer før operationen.
Du må gerne ryge og tygge tyggegummi indtil operationen. Du må også børste tænder og gurgle munden med vand/danskvand. Fast medicin kan indtages med lidt vand.**

Et stigende antal patienter har fået foretaget piercing i tungen. Hvis skruen løsner sig kan den falde ned i svelget eller luftrøret, hvilket kan give alvorlige problemer. Derfor SKAL en piercing i tungen fjernes, senest umiddelbart før operationen.

- 2. Smertestillende medicin af typen ”gigtmidler”, (Kodimagnyl, Albyl, Treo, Diclon, Ibuprofen, mv.) må ikke indtages 14 dage før operationen. Disse midler øger blødningsrisikoen.- hvilket også gælder en del naturpræparater. Præparater som Ginkgo biloba og Fiskeolier må ikke indtages 2 uger før operationen.
Hjertemagnyl/børnemagnyl må heller ikke anvendes 2 uger før operationen.**
- 3. Undgå venligst creme på huden samt tillige makeup og neglelak.**
- 4. Lad smykker, pung og lignende blive hjemme. Klinikken påtager sig ikke ansvar for disse effekter.**
- 5. Hvis du bruger kontaktlinser skal du medbringe beholder til opbevaring af disse.**
- 6. Alt efter operationstype bedes du medbringe løstsiddende tøj (ved brystoperation en bluse/skjorte, der kan åbnes fortil, og ligeledes kan rengøres for eventuelle blod- og væskepletter). En træningsdragt vil være fordelagtig ved en fedtsugning.**
- 7. Det er ulovligt selv at føre køretøj efter en operation. Du skal derfor arrangere transport fra klinikken.**
- 8. Der skal være en anden voksen person hos dig det første døgn efter operationen, også under hjemtransport.**